

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値(1日量)	上限値	設定量(1回量)	設定量(1日量)	単位
02	中心静脈注射	フルダラ静注用 50mg	30mg/m2		31.5mg/m2	30		mg/m2
03	中心静脈注射	エンドキサン注（100mg 500mg）	14.5mg/kg		15.225mg/kg	14.5		mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2	
01	中心静脈注射	グラセトリオン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 Flu/Cy（PTC y 時） 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h：＊点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
02	中心静脈注射	フルダラ静注用 50mg 蒸留水（注射用） 100mL 生理食塩液 100mL 療法名:移植 Flu/Cy（PTC y 時） 中心静脈注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 2.5mL 1 B		10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	
03	中心静脈注射	エンドキサン注（100mg 500mg） 生理食塩液 500mL 療法名:移植 Flu/Cy（PTC y 時） 中心静脈注射: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋		11:00	11:00				
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:移植 Flu/Cy（PTC y 時） 点滴注射: 点滴速度 600ml/h：＊点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1 B		14:00	14:00	11:00	11:00	11:00	