

レジメン名称 : ABVD

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg)	25mg/m2	50mg	25	mg/m2
04	点滴注射	ブレオ注 5mg	10mg/m2	15mg	10	mg/m2
05	点滴注射	エクザール注射用 10mg	6mg/m2	12mg	6	mg/m2
06	点滴注射	ダカルバジン注 100mg	375mg/m2	750mg	375	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:ABVD 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 遮光ルート準備	1V 1B	10:00						
02	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ABVD 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1B	10:30						
03	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:ABVD 点滴注射: 点滴速度 700ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:45						
04	点滴注射	血管外漏出に注意 ブレオ注 5mg 生理食塩液 50mL 療法名:ABVD 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	11:00						
05	点滴注射	ダガルバジン調剤依頼 エクザール注射用 10mg 生理食塩液 50mL 療法名:ABVD	0mg 1B	11:15						

