

レジメン名称 : AEM(追加用)

インターバル日数 : 5 日

基準日 : Day 8

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ノバントロン注(10mg 20mg)	5mg/m2	10mg	5	mg/m2
03	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】	80mg/m2	160mg	80	mg/m2
04	点滴注射	シラベリン注(400mg1000mg)	100mg/m2	200mg	100	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12		
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ [®] 3mg/50mL 療法名:AEM(追加用) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:00	09:00	11:30	11:30			
02	点滴注射	ノバントロン注(10mg 20mg) 生理食塩液 100mL 療法名:AEM(追加用) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	09:30	09:30					
03	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:AEM(追加用) 点滴注射: 点滴速度 325ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:00	10:00					
04	点滴注射	シラベリン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:AEM(追加用) 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	12:00	12:00	12:00	12:00			
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:AEM(追加用) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	1回	1回	1回	1回			
06	点滴注射	ケモセーフ用 ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:AEM(追加用)	1B	2回	2回					

レジメン名称 : AEM(追加用)

インターバル日数 : 5 日

基準日 : Day 8

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12		
07	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ベブシト前後フラッシュ 生理食塩液 50mL 療法名:AEM(追加用) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 キオサト後フラッシュ	1B					1回		