

レジメン名称 : FCR療法

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	フルダラ静注用 50mg	25mg/m2	26.25mg/m2	25	mg/m2
03	点滴注射	エトキシ注 (100mg 500mg)	250mg/m2	262.5mg/m2	250	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:FCR療法 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:00	09:00	09:00				
02	点滴注射	フルダラ静注用 50mg 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 100mL 療法名:FCR療法 点滴注射: 点滴速度 205ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 2.5mL 1B	09:30	09:30	09:30				
03	点滴注射	エトキシ注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:FCR療法 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:00	10:00	10:00				
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:FCR療法 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00	11:00	11:00				