

レジメン名称 : R-THP-COP (R : 500mg) (初回)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リツキサン注(100mg 500mg)	500mg	500mg	500	mg
04	点滴注射	ピノルビン注 10mg	50mg/m2	100mg	50	mg/m2
05	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.4mg/m2	2mg	1.4	mg/m2
06	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg)	750mg/m2	1500mg	750	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:R-THP-COP(R : 500mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 PSL内服確認・朝・昼4時間空ける カロナール内服	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	リツキサン注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:R-THP-COP(R : 500mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 22.5ml/h : *点滴時間 20時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 25mL/h→100mL/h→200mL/h	0mg 450mL	10:30						
03	点滴注射	グラネセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:R-THP-COP(R : 500mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	13:00						
04	点滴注射	ピノルビン注 10mg ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:R-THP-COP(R : 500mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 血管外漏出に注意	0mg 1V	13:30						
05	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL	0mg 1B	13:45						

