

レジメン名称 : 【100】トリアキシン【CLL】

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技   | 薬剤名称                  | 標準値      | 上限値      | 設定量 | 単位    |
|----|------|-----------------------|----------|----------|-----|-------|
| 02 | 点滴注射 | トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL | 100mg/m2 | 105mg/m2 | 100 | mg/m2 |

| RP | 手技   | 薬剤名称   | 用量/単位     | Day1  | Day2  |  |  |  |  |  |
|----|------|--|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL<br>療法名: 【100】トリアキシン【CLL】<br>点滴注射:<br>点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1                | 1袋        | 10:00 | 10:00 |  |  |  |  |  |
| 02 | 点滴注射 | トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL<br>生理食塩液 50mL<br>療法名: 【100】トリアキシン【CLL】<br>点滴注射:<br>点滴速度 2700ml/h : *点滴時間 10分で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg<br>1B | 10:30 | 10:30 |  |  |  |  |  |
| 03 | 点滴注射 | 血管痛に配慮<br>生理食塩液 50mL<br>療法名: 【100】トリアキシン【CLL】<br>点滴注射:<br>点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1                  | 1B        | 10:40 | 10:40 |  |  |  |  |  |