

レジメン名称 : 呼内 ETP/CBDCA/Durva・Apré

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	イミフィンジ点滴静注(120mg 500mg)	1500mg	1500mg	1500	mg
05	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】	80mg/m ²	105mg/m ²	80	mg/m ²
06	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	5 (AUC)	6 (AUC)	5	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA/Durva・Apré 点滴注射: 点滴速度 318ml/h : *点滴時間 20分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA/Durva・Apré 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:20						
03	点滴注射	イミフィンジ点滴静注(120mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA/Durva・Apré 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:25						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA/Durva・Apré 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:25						
05	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA/Durva・Apré 点滴注射: 点滴速度 450ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:30	10:30	10:30				
06	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL	0mg 1袋	13:30						

