

レジメン名称 : 呼内 ETP/CDDP(short hydration)アプレタト インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	ベブシド [®] 100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	80mg/m2	160mg	80	mg/m2
09	点滴注射	ベブシド [®] 100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)アプレタト [®] 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレタト125mg内服 day2.3処方確認	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)アプレタト [®] 点滴注射: 点滴速度 142ml/h : *点滴時間 3.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)アプレタト [®] 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	11:00						
04	点滴注射	ベブシド [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)アプレタト [®] 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1袋	11:30						
05	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ETP/CDDP(short hydration)アプレタト [®] 点滴注射: 点滴速度 2100ml/h : *点滴時間 1時間で	0mg 1袋	13:30						

