

レジメン名称 : 呼内 nabPTX (アブラキサン) / CBDCA / Atezo (day15) インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	アブラキサン点滴静注用 100mg	100mg/m2	200mg	100	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブラキサン) / CBDCA / Atezo (day15) 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1袋	10:00						
02	点滴注射	アブラキサン点滴静注用 100mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 nabPTX (アブラキサン) / CBDCA / Atezo (day15) 点滴注射: 点滴速度 60ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 30mL	10:30						
03	点滴注射	生食はアブラキサン採取量に変更 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブラキサン) / CBDCA / Atezo (day15) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	11:00						