印刷日時　2022-04-13 17:52:58

レジメン名称：呼内 NGT(ﾊｲｶﾑﾁﾝ)　　**インターバル日数**：21 日　　**基準日**：　Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ハイカムチン注射用 1.1mg	1mg/m2	2.4mg	1	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 NGT(ﾊｲｶﾑﾁﾝ) 点滴注射: 点滴速度 201ml/h ： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ１	1A 1B	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
02	点滴注射	ハイカムチン注射用 1.1mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 NGT(ﾊｲｶﾑﾁﾝ) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h ： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ１	0mg 1B	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
03	点滴注射	生理食塩液　50mL 療法名:呼内 NGT(ﾊｲｶﾑﾁﾝ) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h ： ＊点滴時間 5分で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ１ ﾌﾗｯｼｭ用	1B	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00		