印刷日時　2022-04-13 17:54:26

レジメン名称：呼内 (NSCLC)CBDCA単剤　**インターバル日数**：7 日　**基準日**：　Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注 (50mg 150mg) (毒薬)	30mg/m2	60mg	30	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL 療法名:呼内 (NSCLC)CBDCA単剤 点滴注射: 点滴速度 100ml/h ： ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ１	1袋	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
02	点滴注射	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 (NSCLC)CBDCA単剤 点滴注射: 点滴速度 400ml/h ： ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ１	0mg 1袋	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 (NSCLC)CBDCA単剤 点滴注射: 点滴速度 600ml/h ： ＊点滴時間 5分で 投与経路:末梢ﾙｰﾄﾒｲﾝ１ ﾌﾗｯｼｭ用	1B	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30		