

レジメン名称 : 呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタクト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL	1200mg	1200mg	1200	mg
05	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg)	500mg/m2	1000mg	500	mg/m2
07	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	6 (AUC)	1000mg	6	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタクト 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレビタクト125mg内服 day2.3処方確認	2A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタクト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	10:30						
03	点滴注射	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタクト 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 2コース目以降30分まで短縮可能 フィルター使用	0mg 1袋	10:35						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタクト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:35						
05	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタクト 点滴注射:	0mg 1B	11:40						

レジメン名称 : 呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
06	点滴注射	点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1 葉酸 (パソビタン) 処方確認 メコバル筋注 (9週毎) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタト 点滴注射:	1B	11:50						
07	点滴注射	点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタト 点滴注射:	0mg 1袋	12:20						
08	点滴注射	点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アレルギーに注意 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Atezo・アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	13:50						