

レジメン名称 : 呼内 PEM/へ`ハ`シズ`マブ` (継続)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg)	500mg/m2	1000mg	500	mg/m2
04	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg)	15mg/kg	1500mg	15	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 PEM/へ`ハ`シズ`マブ` (継続) 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1袋	10:00						
02	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/へ`ハ`シズ`マブ` (継続) 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 葉酸 (パソビタ) 処方確認 メコバル筋注 (9週毎)	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/へ`ハ`シズ`マブ` (継続) 点滴注射: *点滴速度 600ml/h : 点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:40						
04	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/へ`ハ`シズ`マブ` (継続) 点滴注射: 点滴速度 201ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 高血圧に注意	0mg 1B	11:10						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/へ`ハ`シズ`マブ` (継続) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:40						