

レジメン名称 : 呼外 Bi-weekly GEM/CBDCA

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	2.5 (AUC)	3 (AUC)	2.5	AUC
03	点滴注射	ジェムザール注射用(200mg 1000mg)	800mg/m2	1600mg	800	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注パック 3mg/50mL 療法名:呼外 Bi-weekly GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1袋	10:00						
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 500mL 療法名:呼外 Bi-weekly GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 502ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	ジェムザール注射用(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼外 Bi-weekly GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	11:30						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼外 Bi-weekly GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:00						