

レジメン名称 : 呼外 Bi-weekly TJ

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg)	70mg/m2	140mg	70	mg/m2
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	2.5(AUC)	3(AUC)	2.5	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼外 Bi-weekly TJ 点滴注射: 点滴速度 114ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2V 1A 1A 1B	10:00						
02	点滴注射	グラネセロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼外 Bi-weekly TJ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:30						
03	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:呼外 Bi-weekly TJ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 500mL 療法名:呼外 Bi-weekly TJ 点滴注射: 点滴速度 502ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	12:00						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼外 Bi-weekly TJ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	13:00						