

レジメン名称 : 頭頸部 CDDP動注/STS・イメト[®]

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
05	動脈注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	30mg/m2	60mg	30	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1袋	09:00						
02	点滴注射	プリンペラン注射液 10mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1B	09:30						
03	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1	1袋	10:00						
04	点滴注射	デトキソール静注液 2g/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 72.5ml/h : *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	4A 1袋	10:00						
05	動脈注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメト [®] 動脈注射: その他	0mg 1袋	11:00						
06	点滴注射	20% マンニトール注射液 300mL 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	1B	12:00						

レジメン名称 : 頭頸部 CDDP動注/STS・イメド

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
07	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメド 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1	1袋	13:00						
08	点滴注射	プリンペラン注射液 10mg/2mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメド 点滴注射: 点滴速度 251ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1	1A 1袋	15:00						
09	点滴注射	ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメド 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1	1袋	18:00						
10	点滴注射	ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメド 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	20:00						
11	動脈注射	生理食塩液 100mL 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメド 動脈注射: その他	1B	1回						
12	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメド 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1袋		10:00	10:00				
13	点滴注射	プリンペラン注射液 10mg/2mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:頭頸部 CDDP動注/STS・イメド 点滴注射: 点滴速度 251ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1袋		10:30	10:30				
14	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」	1袋		12:30	12:30				

