

臨床検査値(基準値)一覧表(1)

自治医科大学附属病院

2020年9月1日改訂(2020年9月1日確認)

検査項目		基準値			
		男性	女性		
血液一般検査	白血球数	$\times 10^3/\mu\text{L}$	3.3~8.6		
	赤血球数	$\times 10^6/\mu\text{L}$	4.35~5.55	3.86~4.92	
	ヘモグロビン	g/dL	13.7~16.8	11.6~14.8	
	ヘマトクリット	%	40.7~50.1	35.1~44.4	
	血小板数	$\times 10^3/\mu\text{L}$	158~348		
	MCV	fL	83.6~98.2		
	MCH	pg	27.5~33.2		
	MCHC	g/dL	31.7~35.3		
	網状赤血球数	%	0.2~2.0		
	白血球分画	好中球(%)	%	40.0~71.0	
		好酸球(%)	%	0.2~6.8	
		好塩基球(%)	%	0.0~1.0	
		単球(%)	%	2.3~7.7	
		リンパ球(%)	%	26.2~46.6	
		好中球(#)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	1.3~6.1	
好酸球(#)		$\times 10^3/\mu\text{L}$	0~0.6		
好塩基球(#)		$\times 10^3/\mu\text{L}$	0~0.1		
単球(#)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.1~0.7			
リンパ球(#)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	0.9~4.0			
血液生化学検査	CRP	mg/dL	0.00~0.14		
	総蛋白	g/dL	6.6~8.1		
	アルブミン	g/dL	4.1~5.1		
	ALP	U/L	38~113		
	AMY	U/L	44~132		
	コリンエステラーゼ	U/L	240~486	201~421	
	CPK(CK)	U/L	59~248	41~153	
	γ -GT	U/L	13~64	9~32	
	LDH	U/L	124~222		
	LAP(AA)	U/L	42~76		
	AST(GOT)	U/L	13~30		
	ALT(GPT)	U/L	10~42	7~23	
	尿素窒素	mg/dL	8~20		
	クレアチニン	mg/dL	0.65~1.07	0.46~0.79	
	尿酸	mg/dL	3.7~7.8 *1	2.6~5.5 *1	
	総ビリルビン	mg/dL	0.40~1.50		
	直接ビリルビン	mg/dL	0.06~0.23		
	黄疸指数	Unit	4~6		
	総胆汁酸	$\mu\text{mol/L}$	<12.0		
	HbA1c (NGSP)	%	4.9~6.0		
	血糖	mg/dL	73~109 *2		
	電解質	Na	mmol/L	138~145	
		Cl	mmol/L	101~108	
		K	mmol/L	3.6~4.8	
		Ca	mg/dL	8.8~10.1	
		Mg	mg/dL	1.7~2.5	
		無機P	mg/dL	2.7~4.6	
	血清鉄	$\mu\text{g/dL}$	40~188		
	UIBC	$\mu\text{g/dL}$	126~289	142~341	
	トリグリセリド	mg/dL	40~234 *3	30~117 *3	
	総コレステロール	mg/dL	142~248 *4		
	遊離コレステロール※	mg/dL	30~60		
	リン脂質※	mg/dL	160~260		
遊離脂肪酸※	mEq/L	0.14~0.85			
HDLコレステロール	mg/dL	38~90 *5	48~103 *5		
HDL比(VLDL+LDL)/HDL		1.2~4.8	1.1~4.5		
LDLコレステロール	mg/dL	65~163 *6			
LDL-C(フリーデワルド)	mg/dL	<139			

*1 臨床判断値 : 7mg/dL未満
 *2 臨床判断値 : 110mg/dL未満
 *3 臨床判断値 : 150mg/dL未満

*4 臨床判断値 : 220mg/dL未満
 *5 臨床判断値 : 40mg/dL以上
 *6 臨床判断値 : 140mg/dL未満

※ SRLの基準値

臨床検査値(基準値)一覧表(2)

自治医科大学附属病院

2020年9月1日改訂(2020年9月1日確認)

検査項目		基準値	
		男性	女性
凝固線溶系	トロンボテスト	%	70~130
	PT	秒	正常血漿対照値±10%
	PT-INR		1.00±0.15
	PT%	%	-
	APTT	秒	対照値±25%、正常血漿対照値と比べて5秒以内の延長は正常、10秒以上の延長は異常
	フィブリノーゲン定量	mg/dL	200~400
	FDP	μg/mL	<5.0
	AT-Ⅲ活性	%	80~130
	プラスミノーゲン活性	%	80~130
	α2-PI活性	%	80~130
	Dダイマー	μg/mL	<1
	プロテインC活性	%	75~150 新生児:成人の30~60% 1歳児:成人の70%
	TAT(トロンビン-抗トロンビンⅢ複合体)	ng/mL	<4.0
	PIC(プラスミン-α ² PI複合体)	μg/mL	<0.8
	LA因子		陰性<1.1 1.1≤ボーダーライン<1.3 陽性≥1.3
出血時間	min	0.5~3.0	
赤血球沈降速度試験(1時間値)	mm	2-10 3-15	

尿検査	HCG	定性	(25-)
		定量	mIU/mL <2.5
	色調		黄色*8
	尿比重		1.005~1.030
	尿pH		5.0~8.0
	尿蛋白定性		(-)
	尿糖定性		(-)
	尿ウロビリノーゲン		(+)
	尿ビリルビン		(-)
	尿ケトン体		(-)
	尿潜血反応		(-)
	尿亜硝酸塩		(-)
	白血球		(-)

*8 黄色以外は異常