

臨床検査値(基準値)一覧表(1)

自治医科大学附属病院

2026年8月21日改訂

検査項目			基準値	
			男性	女性
血液一般検査	白血球数	$\times 10^3/\mu\text{L}$	3.3~8.6	
	赤血球数	$\times 10^6/\mu\text{L}$	4.35~5.55	3.86~4.92
	ヘモグロビン	g/dL	13.7~16.8	11.6~14.8
	ヘマトクリット	%	40.7~50.1	35.1~44.4
	血小板数	$\times 10^3/\mu\text{L}$	158~348	
	MCV	fL	83.6~98.2	
	MCH	pg	27.5~33.2	
	MCHC	g/dL	31.7~35.3	
	網状赤血球数	%	0.2~2.0	
	白血球分画	好中球 (%)	40.0~71.0	
		好酸球 (%)	0.2~6.8	
		好塩基球 (%)	0.0~1.0	
		単球 (%)	2.3~7.7	
		リンパ球 (%)	26.2~46.6	
		好中球 (#)	$1.3\sim6.1$	
		好酸球 (#)	$0\sim0.6$	
		好塩基球 (#)	$0\sim0.1$	
		単球 (#)	$0.1\sim0.7$	
		リンパ球 (#)	$0.9\sim4.0$	
血液生化学検査	CRP	mg/dL	0.00~0.14	
	総蛋白	g/dL	6.6~8.1	
	アルブミン	g/dL	4.1~5.1	
	ALP	U/L	38~113	
	AMY	U/L	44~132	
	コリンエステラーゼ	U/L	240~486	201~421
	CPK(CK)	U/L	59~248	41~153
	γ -GT	U/L	13~64	9~32
	LDH	U/L	124~222	
	LAP(AA)	U/L	42~76	
	AST(GOT)	U/L	13~30	
	ALT(GPT)	U/L	10~42	7~23
	尿素窒素	mg/dL	8~20	
	クレアチニン	mg/dL	0.65~1.07	0.46~0.79
	尿酸	mg/dL	3.7~7.8 *1	2.6~5.5 *1
	総ビリルビン	mg/dL	0.40~1.50	
	直接ビリルビン	mg/dL	0.06~0.23	
	黄疸指数	Unit	4~6	
	総胆汁酸	$\mu\text{mol/L}$	<12.0	
	HbA1c (NGSP)	%	4.9~6.0	
	血糖	mg/dL	73~109 *2	
	電解質	Na	mmol/L 138~145	
		Cl	mmol/L 101~108	
		K	mmol/L 3.6~4.8	
		Ca	mg/dL 8.8~10.1	
		Mg	mg/dL 1.7~2.5	
		無機P	mg/dL 2.7~4.6	
	血清鉄	$\mu\text{g/dL}$	40~188	
	UIBC	$\mu\text{g/dL}$	126~289	142~341
	トリグリセリド	mg/dL	40~234 *3	30~117 *3
	総コレステロール	mg/dL	142~248 *4	
	遊離コレステロール※	mg/dL	30~60	
	リン脂質※	mg/dL	160~260	
	遊離脂肪酸※	$\mu\text{Eq/L}$	140~850	
	HDLコレステロール	mg/dL	38~90 *5	48~103 *5
	HDL比(VLDL+LDL)/HDL		1.2~4.8	1.1~4.5
	LDLコレステロール	mg/dL	65~163 *6	
	LDL-C(フリーデワルド)	mg/dL	<139	

*1 臨床判断値 : 7mg/dL未満

*2 臨床判断値 : 110mg/dL未満

*3 臨床判断値 : 150mg/dL未満(空腹時)

臨床判断値 : 175mg/dL未満(随時)

※ SRLの基準値

*4 臨床判断値 : 220mg/dL未満

*5 臨床判断値 : 40mg/dL以上

*6 臨床判断値 : 140mg/dL未満

臨床検査値(基準値)一覧表(2)

自治医科大学附属病院

2026年8月21日改訂

検査項目		基準値	
		男性	女性
PT	秒	正常血漿対照値±10%	
PT-INR		1.00±0.15	
PT%	%	80～100%	
APTT	秒	対照値±25%、正常血漿対照値と比べて5秒以内の延長は正常、10秒以上の延長は異常	
フィブリノーゲン定量	mg/dL	200～400	
FDP	μg/mL	<5.0	
AT-Ⅲ活性	%	80～130	
プラスミノーゲン活性	%	80～130	
α2-PI活性	%	80～130	
Dダイマー	μg/mL	<1	
プロテインC活性	%	70～150 新生児:成人の30～60% 1歳児:成人の70%	
TAT(トロンビン-抗トロンビンⅢ複合体)	ng/mL	<4.0	
PIC(プラスミン-α ² PI複合体)	μg/mL	<0.8	
LA因子		1.2≤ボーダーライン<1.3 陽性≥1.3	
出血時間	min	0.5～3.0	
赤血球沈降速度試験(1時間値)	mm	2-10	3-15

尿検査	HCG	定性	IU/L	(25-)
		定量	mIU/mL	<2.5
	色調			黄色
	尿比重			1.005～1.030
	尿pH			5.0～8.0
	尿蛋白定性			(-)
	尿糖定性			(-)
	尿ウロビリノーゲン			(+-)
	尿ビリルビン			(-)
	尿ケトン体			(-)
	尿潜血反応			(-)
	尿亜硝酸塩			(-)
	白血球			(-)