

那須IVR 2014/05/17

栃木医療センター
河合陽



膵頭癌、胆管stent留置後の繰り返す
吐血に対してNBCA塞栓術を施行した1例


症例

- 7X歳男性
- 発熱、嘔吐。
- CTにて肝内胆管拡張あり。造影CT/ERCPにて膵頭部癌疑い。下部総胆管にstent留置。
- 術後約1Wで吐下血あり。
- 既往歴
 - Af: warfarin+
 - Type2 DM
 - 虫垂炎術後


症例

- Physical JCS 0, 眼瞼結膜に貧血・黄疸なし。
- Vital BP 117/69 SpO2 98% RA
HR 78/min BT 39.2°C
- Labos WBC 13200 Hb 11.5 → 6.0
Plt 18.7万 INR 4.81
TP 6.8 Alb 3.1
T-Bil 1.86


Dynamic CT



Dynamic CT




血管造影所見：腹腔動脈



血管造影所見:SD



血管造影所見：NBCA + coil



術後経過

- 治療終了後、吐血・下血なし。
- POD5 GF:出血無し。拍動性圧迫(Aoか?)のみ。
- POD7 食事開始。
- POD12 退院。

- Caに関しては加療せずの方針。

栃木医療センター



今後とも、ご指導宜しくお願いいたします。